

TM[®] 700

Ficha Técnica

Nome Comercial

TM 700

Descrição do Produto

Premix antibacteriano de amplo espectro para uso em rações de aves, suínos, crustáceos e peixes.

Tipo de Produto

Antibiótico para Aves, Suínos, Crustáceos e Peixes.

Composição

700 g de terramicina (marca da oxitetraciclina) a cada 1000g.

Indicação

É indicado para o tratamento via ração das doenças infecciosas de suínos, aves, crustáceos e peixes produzidas por microorganismo sensíveis à oxitetraciclina.

Aves que não se destinam à produção de ovos para consumo humano: Doenças respiratórias (*Mycoplasma sp.*, *Escherichia coli*, *Pasteurella sp.*), sinovite (*Mycoplasma sp.*), cólera (*Pasteurella sp.*) e tifo aviário (*Salmonella sp.*).

Suínos: Pneumonia (*Pasteurella sp.*, *Haemophilus sp.*, *Mycoplasma sp.*, *Bordetella bronchiseptica*), metrites (*Corynebacterium sp.*), abscessos (*Streptococcus sp.*, *Corynebacterium sp.*) e erisipela (*Erysipelotrix rhusiopathiae*). Leptospirose (*Leptospira pomona*), diarreia (*T. hyodisenteriae*).

Crustáceos e lagostas: Infecções por *Aerococcus viridans*.

Bagres: Septicemia hemorrágica (*Aeromonas liquefaciens*) e doenças por pseudomonas.

Salmonídeos: Doença ulcerosa (*Haemophilus piscium*), furunculose (*Aeromonas salmonicida*), septicemia hemorrágica (*Aeromonas liquefaciens*) e doença por pseudomonas.

Modo de Usar

Aves que não se destinam à produção de ovos para consumo humano: 500g de terramicina/tonelada de alimento ou 0,715kg de TM-700 por tonelada de alimento.

Suínos: 22mg de terramicina/kg de peso vivo/dia ou 1,125kg de TM-700 por tonelada de alimento.

Crustáceos e Lagostas: 2,2250g de terramicina/tonelada de alimento ou 3,220kg de TM-700 por tonelada de alimento.

Salmonídeos: 8,3g de terramicina, ou seja: 11,85g de TM-700 por kg de peso vivo/dia

Bagres: 8,3g de terramicina, ou seja: 11,85g de TM-700 por kg de peso vivo/dia.

Restrições de Uso

A ração medicada com TM 700 deverá ser administrada continuamente como único alimento durante o período de tratamento. Os tratamentos não deverão ser interrompidos exceto ao término dos períodos indicados, ou por recomendação do médico veterinário.

Não utilizar em aves de produtoras de ovos para consumo humano.

Não usar TM 700 em sub dose, nem suspender o uso antes do término dos períodos indicados, mesmo que os animais apresentem melhora antes disso. Assegurar-se de que todos os animais em tratamento tenham livre acesso e consumam o alimento medicado. Assim como todo medicamento, TM 700 deve ser manipulado sob cuidados que incluem: utilização de roupa adequada, luvas, máscara com filtros antipó. Os funcionários devem tomar banho ao final do período de trabalho.

Modo de Conservação

Conservar o produto em lugar fresco seco, ao abrigo da luz, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Período de retirada *

Aves: 3 dias antes do abate.

Suínos: 5 dias antes do abate.

Crustáceos e lagosta: 30 dias antes do abate.

Salmonídeos: 21 dias antes do abate.

Bagres: 21 dias antes do abate.

Apresentação

Embalagem de 25 kg.

SAC 0800 722 8011
phibro.sac@pahc.com
www.phibro.com.br



* APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE PARA O BRASIL.

TM[®] é marca registrada de Phibro Saúde Animal Internacional Ltda.

Av. Pres. Tancredo A. Neves, 1111
07112-070 – Guarulhos – SP - Brasil
TM700/BR/0113